

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że

- działanie ortokorekcji może się różnić w zależności od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Nawet przy najbardziej dokładnych pomiarach oczu oraz prawidłowym stosowaniu soczewek, nie zawsze można przewidzieć jak ostatecznie moje oczy zareagują na jej działanie
- mimo że wiele badań naukowych potwierdza pozytywny wpływ ortokorekcji na spowolnienie pogłębiania się krótkowzroczności, to jednak nie można zagwarantować, że efekt ten będzie zauważalny u każdego pacjenta stosującego ortokorekcję
- jeśli będę spał-a krócej niż **8 godzin**, nie osiągnę dobrego widzenia w ciągu dnia
- jeśli soczewki będą zabrudzone, to moja wada nie zostanie w pełni skorygowana, ponieważ soczewki nie będą prawidłowo przylegać do rogówki
- brudne soczewki, pojemniczek do przechowywania soczewek czy przyssawka zwiększają ryzyko pojawienia się infekcji oczu
- soczewki, pojemniczek do przechowywania soczewek oraz przyssawka nigdy nie powinny mieć kontaktu z bieżącą wodą, z powodu zwiększonego ryzyka infekcji oczu
- makijaż, który będzie niedokładnie zmyty, może dostać się pod soczewki, zakłócając ich działanie podczas snu, a także zwiększając ryzyko pojawienia się owrzodzenia rogówki
- przy starannym dbaniu o higienę oraz ścisłym przestrzeganiu zaleceń specjalisty, ryzyko infekcji oczu podczas stosowania ortokorekcji, jest niewielkie i porównywalne do ryzyka związanego z noszeniem dziennych soczewek
- zgodnie z zaleceniami producenta, powinienem/-am wymieniać soczewki na nowe po **1 roku** użytkowania, chyba że specjalista zdecyduje inaczej

data i podpis użytkownika i / lub opiekuna prawnego